

## ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ของประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในลำดับที่ ๗๖, ๑๗๐, ๒๗๓ และลำดับที่ ๔๖๒ ของอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“- ลำดับที่ ๗๖ ชื่อสามัญ atrazine + mesotrione ความเข้มข้นและสูตร ๒๕ % + ๒.๕ % W/V SC

- ลำดับที่ ๑๗๐ ชื่อสามัญ chlorantraniliprole ความเข้มข้นและสูตร ๖๒.๕ % W/V FS (๕๐ % W/W )

- ลำดับที่ ๒๗๓ ชื่อสามัญ dimethenamid ความเข้มข้นและสูตร ๙๐ % W/V EC

- ลำดับที่ ๔๖๒ ชื่อสามัญ magnesium phosphide ความเข้มข้นและสูตร ๕๖ % PLATE”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในลำดับที่ ๕๘๒ ของอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในลำดับที่ ๘ และลำดับที่ ๒๕ ของอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“- ลำดับที่ ๘ ชื่อสามัญ aminopyralid potassium + triclopyr butoxyethyl ester ความเข้มข้นและสูตร ๑.๗๗ % + ๓๓.๓๕ % W/V EW

- ลำดับที่ ๒๕ ชื่อสามัญ deltamethrin ความเข้มข้นและสูตร ๐.๔ % LN ”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน แนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ดำรงค์ จิระสุทัศน์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

| อัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน                                        |                                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร                                                                       |                                            |                                 |
| เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ ๓)<br>พ.ศ.๒๕๕๖ |                                            |                                 |
| ลำดับที่                                                                                           | ชื่อสามัญ                                  | ความเข้มข้นและสูตรผสม           |
| 1                                                                                                  | 2,4-D + penoxsulam                         | 1.04 % + 0.01 % GR              |
| 2                                                                                                  | alpha-cypermethrin                         | 0.34 % LN                       |
| 3                                                                                                  | atrazine + mesotrione +<br>S-metolachlor   | 11.2 % + 2.98 % + 29.8 % W/V ZC |
| 4                                                                                                  | azimsulfuron                               | 50 % WG                         |
| 5                                                                                                  | azoxystrobin                               | 9.5 % W/V DC                    |
| 6                                                                                                  | azoxystrobin + cyproconazole               | 20 % + 8 % W/V SC               |
| 7                                                                                                  | azoxystrobin + fludioxonil                 | 23.9 % + 23.9 % W/V SC          |
| 8                                                                                                  | azoxystrobin + propiconazole               | 7.5 % + 12.5 % W/V SE           |
| 9                                                                                                  | azoxystrobin + tebuconazole                | 12 % + 16 % W/V SE              |
| 10                                                                                                 | azoxystrobin + tricyclazole                | 7.5 % + 22.5 % W/V SC           |
| 11                                                                                                 | bensulfuron-methyl + bispyribac-<br>sodium | 12 % + 18 % WP                  |
| 12                                                                                                 | bispyribac-sodium + metamifop              | 4 % + 10 % W/V SE               |
| 13                                                                                                 | captan + hexaconazole                      | 75 % + 5 % WP                   |
| 14                                                                                                 | carbendazim + iprodione                    | 17.5 % + 35 % W/V SC            |
| 15                                                                                                 | chlorantraniliprole + thiamethoxam         | 10 % + 20 % W/V SC              |
| 16                                                                                                 | clomazone + pendimethalin                  | 4.3 % + 30 % W/V CS             |
| 17                                                                                                 | clothianidin                               | 60 % W/V SC                     |
| 18                                                                                                 | clothianidin + imidacloprid                | 36 % + 24 % W/V FS              |
| 19                                                                                                 | cyantraniliprole                           | 62.5 % W/V FS (50 % W/W )       |
| 20                                                                                                 | cyenopyrafen                               | 30 % W/V SC                     |
| 21                                                                                                 | deltamethrin                               | 0.3 % W/W IMPREGNATED BAG       |
| 22                                                                                                 | fenoxanil + isoprothiolane                 | 5 % + 30 % W/V EC               |
| 23                                                                                                 | fenoxasulfone                              | 40 % W/V SC                     |
| 24                                                                                                 | fenpyroximate                              | 5 % W/V EC                      |
| 25                                                                                                 | fluopicolide + propineb                    | 6 % + 66.7 % WP                 |

| ลำดับที่ | ชื่อสามัญ                                           | ความเข้มข้นและสูตรผสม    |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 26       | fluoxastrobin + flutriafol                          | 14.84 % + 19.30 % W/V SC |
| 27       | imazapic + imazapyr                                 | 26.25 % + 8.75 % W/V SL  |
| 28       | ipconazole + metalaxyl                              | 2.42 % + 1.94 % W/V FS   |
| 29       | kasugamycin hydrochloride hydrate<br>+ tricyclazole | 1.20 % + 8 % W/V SC      |
| 30       | meptyldinocap                                       | 35 % W/V EC              |
| 31       | metalaxyl                                           | 35 % WS                  |
| 32       | methoxyfenozide + spinetoram                        | 30 % + 6 % W/V SC        |
| 33       | monosultap                                          | 90 % SP                  |
| 34       | nicosulfuron                                        | 4 % W/V SC               |
| 35       | nitenpyram                                          | 10 % W/V SL              |
| 36       | pendimethalin                                       | 40 % W/V SC              |
| 37       | pendimethalin + penoxsulam                          | 24 % + 1 % W/V SE        |
| 38       | pethoxamid                                          | 60 % W/V EC              |
| 39       | phosphine                                           | 99.30 % GA               |
| 40       | pyraclonil                                          | 3.6 % W/V SC             |
| 41       | pyraclostrobin                                      | 10 % W/V CS              |
| 42       | spirotetramat                                       | 24 % W/V SC              |
| 43       | tefuryltrione                                       | 30 % WP                  |
| 44       | tiadinil                                            | 6 % GR                   |
| 45       | tiadinil                                            | 30 % W/V SC              |
| 46       | thiophanate-methyl + tricyclazole                   | 35 % + 37.5 % WP         |